

Je soussigné(e) SAHRA BANNIER, donne mon consentement éclairé au plan de traitement proposé par mon dentiste qui a réalisé le bilan clinique et étudié les examens complémentaires et qui m'a informé des autres solutions possibles pour mes soins dentaires.

Je certifie avoir reçu les informations, indications et contre indications nécessaires et avoir obtenu les réponses satisfaisantes à mes questions concernant ces actes.

Les conditions d'asepsie devant être rigoureuses. Le matériel utilisé sera stérile et à usage unique.

Les suites opératoires immédiates de ces interventions peuvent être variables d'un patient à l'autre :

Le seuil de la douleur n'étant pas la même chez chaque patient, des antalgiques vous seront prescrits.

Une couverture antibiotique sera également indispensable pour éviter une complication infectieuse.

Un oedème post opératoire peut apparaître mais ne signifiera en aucune manière une quelconque complication.

Un hématome post-chirurgical peut également apparaître. Il ne sera qu'un désagrément esthétique passager.

Après l'extraction d'une dent de sagesse du bas proche du canal dentaire une sensation d'anesthésie ou paresthésie peut persister pendant plusieurs semaines, il vous faudra patienter.

Prenez les médicaments que nous vous avons prescrits et respectez la posologie. Ce traitement est adapté à votre prise en charge chirurgicale et aucune prise ne doit être oubliée.

Après l'intervention, faites attention de ne pas mordre les endroits endormis : joues, lèvres, langue. Ne vous brûlez pas avec des boissons trop chaudes. Éviter l'alcool et le tabac le plus longtemps possible. Ne pas cracher éviter les bains de bouche. Ne pas prendre d'aspirine (risque d'hémorragie).

Durant les premières heures après l'opération, il peut exister une douleur post-opératoire. Ne la laissez pas s'installer.

Prenez les antalgiques tels que prescrits sur l'ordonnance que l'on vous a remis.

De même, un léger saignement peut apparaître au niveau du site opératoire. N'aspirez pas le sang dans un mouvement de succion et/ou ne crachez pas. Mordez sur une compresse pendant une dizaine de minutes. Renouvelez la compresse si besoin. Si le saignement persiste ou est abondant, téléphonez au cabinet dentaire.

Dans les premiers jours, un léger oedème ou certaines marques peuvent apparaître. Ils disparaîtront dans une semaine environ.

Pour ne pas entraver la guérison : ne touchez pas la zone opérée, ne jouez pas avec les fils de suture ou n'explorez pas le site opéré avec votre langue, ne mâchez pas sur la zone opérée.

Les fumeurs doivent s'abstenir de fumer.

Une alimentation froide, semi-liquide ou liquide doit être privilégiée. Buvez beaucoup de liquides froids, évitez le chaud.

Pas de boisson alcoolisée.

continuez le brossage des dents et des gencives comme d'habitude sur les secteurs non opérés mais NE BROSSEZ

PAS VOS DENTS en regard de la zone opérée pendant 3 ou 4 jours

Fait à Marseille le

Signature

18 février 2022

lu et approuvé
