

Cabinet Dentaire Capelette

78 boulevard Mireille Lauze

13010 MARSEILLE

04 91 79 85 82

Consultations sur rendez-vous

Docteur ELSA ESKENAZI SOLAL

CONSENTEMENT ECLAIRE IMPLANTOLOGIE

La Convention Nationale de la Sécurité Sociale des Chirurgiens Dentistes et l'article 33 du Code de Déontologie nous font obligation de vous faire signer un consentement écrit.

Nous vous précisons que ce document ne dégage en aucune façon notre responsabilité.

Je soussigné(e) Mme TRETOLA FREDERIQUE né(e) le 15/06/1958,

certifie avoir été informé par mon dentiste de toutes les solutions de réhabilitation buccale c'est à dire la pose d'implants ou le traitement classique sans implants (bridge, appareil amovible).

Je comprends les avantages et les inconvénients de toutes les solutions et je choisis la pose d'implants.

J'ai décrit mon état de santé physique et mentale à mon dentiste et mentionné toute possibilité d'allergie ou réaction inhabituelle aux médicaments.

ainsi que toute réaction anormale des gencives, tout saignement anormal...

J'ai eu délai suffisant entre la première consultation et la date d'intervention et mon dentiste a répondu à toutes mes interrogations.

En complément de notre entretien oral, voici quelques précisions par écrit :

Avant toute décision de traitement, nous évaluons si votre état général et buccal s'adapte à ce type de traitement.

Nous ferons un scanner si nécessaire.

Suite à l'examen clinique et radiologique, la décision de pose d'implants sera prise.

En cas de volume osseux insuffisant, une reconstruction osseuse peut vous être proposée.

Elle sera effectuée soit dans la même séance que la pose des implants, soit lors d'une séance précédente.

Pour reconstruire le volume osseux nécessaire à une réhabilitation stable et esthétique, nous utiliserons soit une greffe d'os autogène, soit un substitut osseux résorbable.

Les implants endo-osseux posés sous anesthésie locale seront laissés au repos pendant 2 à 6 mois.

En cas de pose de membrane ou de greffe osseuse, cette période pourra être augmentée.

Les conditions d'asepsie devant être rigoureuses, le matériel utilisé sera stérile et/ou à usage unique.

Les suites opératoires immédiates de ces interventions peuvent être variables d'un patient à l'autre :

Le seuil de la douleur n'étant pas la même chez chaque patient, des antalgiques vous seront prescrits.

Une couverture antibiotique sera également indispensable pour éviter une complication infectieuse.

Un œdème post opératoire peut apparaître mais ne signifiera en aucune manière une quelconque complication.

Un hématome post-chirurgical peut également apparaître. Il ne sera qu'un désagrément esthétique passager.

La moindre sensibilité au niveau de la gencive devra être signalée à mon dentiste.

Le taux de stabilité de ces racines artificielles est de l'ordre de 95% (taux qui diminue nettement chez les fumeurs).

Si une mobilité apparaît lors du dégagement de l'implant ou peu après pouvant signifier la non ostéointégration de l'implant, il sera déposé et remplacé si aucune contre-indication ne s'y oppose, (soins pris en charge par votre chirurgien dentiste).

Dans cette éventualité le traitement sera obligatoirement prolongé de quelque mois.


L'hygiène autour de ces racines artificielles devra être la plus efficace possible.

La pose d'implants nécessite un suivi très rigoureux.

Durant les premières années qui suivent la pose de la prothèse, faites un contrôle chaque 6 mois,

J'ai lu et j'ai compris ce document le jeudi 3 septembre 2020

Mme TRETOLA FREDERIQUE

Lu et approuvé. 

Cabinet Dentaire Capelette

78 boulevard Mireille Lauze

13010 MARSEILLE

04 91 79 85 82

Consultations sur rendez-vous

Docteur ELSA ESKENAZI SOLAL

A l'attention de Mme FREDERIQUE TRETOLA

CONSEILS POST-OPERATOIRES

Vous venez de bénéficier d'une intervention chirurgicale. C'est dans les premiers jours que démarre le processus de cicatrisation. Quelques règles sont à respecter pour améliorer la guérison et éviter certaines complications :

- Prenez les médicaments prescrits par votre chirurgien-dentiste et respectez la posologie. Ce traitement est adapté à votre prise en charge chirurgicale et aucune prise ne doit être oubliée.
- Après l'intervention, faites attention de ne pas mordre les endroits endormis : joues, lèvres, langue. Ne vous brûlez pas avec des boissons trop chaudes. Eviter l'alcool et le tabac le plus longtemps possible. Eviter les efforts physiques violents. Ne pas cracher, éviter les bains de bouche. Ne pas prendre d'aspirine (risque d'hémorragie)
- Durant les premières heures après l'opération, il peut exister une douleur post-opératoire. Ne la laissez pas s'installer. Prenez les antalgiques tels que prescrits sur l'ordonnance que l'on vous a remis. Vous pouvez également placer une vessie de glace au niveau de la joue, en regard de la région opérée pendant quelques heures.
- De même, un léger saignement peut apparaître au niveau du site opératoire. N'aspirez pas le sang dans un mouvement de succion et/ou ne crachez pas. Mordez sur une compresse pendant une dizaine de minute. Renouvelez la compresse si besoin. Si le saignement persiste ou est abondant, téléphonez au cabinet dentaire.
- Dans les premiers jours, un léger œdème ou certaines marques peuvent apparaître. Ils disparaîtront en une semaine environ. Cela ne compromet pas le résultat de la chirurgie. L'application, à l'extérieur, sur la joue, de glace pendant 10 minutes toutes les 15 minutes, la fera diminuer et réduire de même la douleur dans les 3 heures qui suivent l'intervention. (pack bleu de glacière au Frigidaire ou Cold pack acheté en pharmacie).
- Pour ne pas entraver la guérison : ne touchez pas la zone opérée, ne jouez pas avec les fils de suture ou n'explorez pas le site opéré avec votre langue, ne mâchez pas sur la zone opérée.
- Les fumeurs doivent s'abstenir de fumer.
- Une alimentation froide semi-liquide ou liquide doit être privilégiée. Buvez beaucoup de liquides froids, évitez le chaud. Pas de boisson alcoolisée.
- continuez le brossage des dents et des gencives comme d'habitude sur les secteurs non opérés mais NE BROSSEZ PAS VOS DENTS en regard de la zone opérée avant la dépose des fils de suture mais appliquez généreusement ELUGEL®.
- Au niveau du site opératoire, à partir de la dépose des fils de suture, pendant 10 jours, utilisez une brosse à dent post-chirurgicale (6/100^{ème} ou 7/100^{ème}) puis finissez par un bain de bouche.
- Les 10 jours suivants, vous reprendrez progressivement le brossage avec une brosse à dent douce (15/100^{ème}).

N'hésitez pas à contactez le cabinet si vous avez un doute ou une question.

Fait à MARSEILLE, le 03/09/2020

Docteur ELSA ESKENAZI SOLAL

